

Perilla frutescens (L.) Britton, 1894 var. crispa

Identifiants : 23680/perfrub

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 04/06/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Clade : Lamiales ;
- Ordre : Lamiales ;
- Famille : Lamiaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Lamiales ;
- Famille : Lamiaceae ;
- Genre : Perilla ;

- Synonymes : Mentha reticulosa Hance 1952 ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Cock's comb perilla, , Angami, Arim, Bai-su-zi, Ban tulsī, Bhangiro, Bhanjira, Che-so, Chiso, Deulkae, Egoma, Gee so, Jen, Jhutela, Kenia, Kkaennip, Naga machala, Ngaa khee mon, Perille verte cultivée, Ri ben bai su, Seelam, Shan-hnan, Shiso, Silam, Silame, Sipui, Snem, Sookloti, Tanam, Thi, Tia To, Zhou bai su, Zi su ;



- Rapport de consommation et comestibilité/comestibilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Partie(s) comestible(s)^{{{(0+*)}}} : feuilles, graines - épice, fleurs, graines - huile, légume^{{{(0+*)}}}.

Utilisation(s)/usage(s)^μ^{{{(0+*)}}} culinaire(s) :

-les jeunes feuilles, les fleurs et les graines sont consommées cuites ; elles peuvent être séchées et utilisées plus tard ; elles sont également utilisées pour l'assaisonnement ; feuilles cuites comme pothérbe^{{{(dp*)}}}.

-les jeunes cotylédons sont mis à germer et mangés ;

-les graines grillées sont picklées ;

-l'huile des graines est utilisée comme ingrédient dans la cuisine ;

-elles sont utilisées pour améliorer le goût de curry^{{{(0+*)}}} (s'agit-il des graines, des feuilles, de l'huile ou des trois ? (qp*)).(1*)

Les jeunes feuilles, fleurs et graines sont consommées cuites. Ils peuvent être séchés et utilisés plus tard. Ils sont également utilisés pour l'aromatisation. Ils sont utilisés dans le chutney. Les jeunes cotylédons sont germés et mangés. Les graines grillées sont marinées. L'huile de graines est utilisée comme ingrédient en cuisine. Ils sont utilisés pour améliorer le goût du curry. Attention: Les formes sauvages sont toxiques à cause des cétones. Ce sont des toxines pour le foie

Partie testée : feuilles^{{{(0+*)}}} (traduction automatique)

Original : Leaves^{{{(0+*)}}}

Taux d'humidité Énergie (kj) Énergie (kcal) Protéines (g) Pro- Vitamines C (mg) Fer (mg) Zinc (mg)

86

176

42

3.4

vitamines A (μg)

0 0

6.7

0



néant, inconnus ou indéterminés.(1*)**ATTENTION^{0(+x)}** : les formes sauvages sont toxiques pour le foie, en raison de cétones^{{{(0(+x))}}}.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :