Aponogeton madagascariensis (Mirb.) H.Bruggen, 1968 (Dentelle de Madagascar)

Identifiants : 2794/apomad

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 09/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
  - ***Clade : Angiospermes ;***
  - ***Clade : Monocotylédones ;***
  - ***Ordre : Alismatales ;***
  - ***Famille : Aponogetonaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
  - ***Règne : Plantae ;***
  - ***Division : Magnoliophyta ;***
  - ***Classe : Liliopsida ;***
  - ***Ordre : Najadales ;***
  - ***Famille : Aponogetonaceae ;***
  - ***Genre : Aponogeton ;***
- ***Synonymes : Aponogeton fenestralis (Pers.) Hook.f. 1883, Ouvirandra fenestralis (Pers.) Poir. 1816 ;***
- ***Synonymes français : aponogeton de Madagascar, plante-dentelle, plante-grillage (plante grillage), ouvirandre ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Madagascar laceleaf, lattice-leaf (lattice-leaf), lace plant, water yam (water-yam), Madagascar laceplant , oviranda (local), ovirandrana (local) ;***

- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Racines consommées localement cuites, comme légume{{{27(+x)}. Tubercules comestibles. De Flacourt, dans son Histoire de la grande isle de

  Madagascar, dit : Ouvirandre, petites racines grosses

  comme le pouce, très bonnes à manger{{{76(+x)}

  Le tubercule féculent est mangé

  Partie testée : corme{{{0(+x) (traduction automatique)}
  Original : Corm{{{0(+x)}

Taux d'humidité	*Énergie (kj)*	*Énergie (kcal)*	*Protéines (g)*	*Pro-vitamines A (µg)*	*Vitamines C (mg)*	*Fer (mg)*	*Zinc (mg)*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***



Par Curtis, W., Botanical Magazine (1800-1948) Bot. Mag. vol. 82 (1856), via plantillustrations

- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - ***Distribution :***

    Une plante subtropicale. C'est une plante aquatique. Il est cultivé dans l'eau courante fraîche. Il fonctionne mieux avec une température de 18 ° -22 ° C. Il fait mieux avec une période de dormance sèche et des températures plus basses d'environ 12 ° C pendant plusieurs mois[{{{0(+x) (traduction automatique)}}}.

    Original : A subtropical plant. It is a water plant. It is grown in cool running water. It does best with a temperature of 18Â°-22Â°C. It does best with a dry dormant period and lower temperatures of about 12Â°C for several months[{{{0(+x)}}}.

  - ***Localisation :***

    Asie, Afrique de l'Est, Madagascar, Malaisie, Maurice, Asie du Sud-Est[{{{0(+x) (traduction automatique)}}}.

    Original : Asia, East Africa, Madagascar, Malaysia, Mauritius, SE Asia[{{{0(+x)}}}.

  - ***Notes :***

    Il existe environ 12 à 44 espèces d'Aponogeton. Ils sont tropicaux et subtropicaux[{{{0(+x) (traduction automatique)}}}.

    Original : There are about 12-44 Aponogeton species. They are tropical and subtropical[{{{0(+x)}}}.

- ***Liens, sources et/ou références :***

  - ***Jardin! L'Encyclopédie :*** https://nature.jardin.free.fr/1107/aponogeton_fenestralis.html ***;***
  - ***Wikipedia :***
    - https://fr.wikipedia.org/wiki/Aponogeton_madagascariensis (en français) ***;***
    - https://en.wikipedia.org/wiki/Aponogeton_madagascariensis (source en anglais) ***;***

  dont classification :

  dont livres et bases de données : [27]Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 30 [Aponogeton fenestralis Hook.f.], par Louis Bubenicek), 76Le Potager d'un curieux - histoire, culture et usages de 250 plantes comestibles peu connues ou inconnues (livre, pages 31 [Ouvirandra fenestralis (Pers.) Poir.], par A. Paillieux et D. Bois) ;

  dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  Bircher, A. G. & Bircher, W. H., 2000, Encyclopedia of Fruit Trees and Edible Flowering Plants in Egypt and the Subtropics. AUC Press. p 36 (As Aponogeton fenestralis) ; Blumea 16:249. 1968 ; Burkill, I.H., 1966, A Dictionary of the Economic Products of the Malay Peninsula. Ministry of Agriculture and Cooperatives, Kuala Lumpur, Malaysia. Vol 1 (A-H) p 195 (As Aponogeton fenestralis) ; Hedrick, U.P., 1919, (Ed.), Sturtevant's edible plants of the world. p 65 (As Aponogeton fenestralis) ; Heywood, V.H., Brummitt, R.K., Culham, A., and Seberg, O., 2007, Flowering Plant Families of the World. Royal Botanical Gardens, Kew. p 344 ; Lim, T. K., 2015, Edible Medicinal and Non Medicinal Plants. Volume 9, Modified Stems, Roots, Bulbs. Springer p 10 ; PROSEA handbook Volume 9 Plants yielding non-seed carbohydrates. p 187 (As Aponogeton fenestralis) ; Romanowski, N., 2007, Edible Water Gardens. Hyland House. p 37