Vitis coignetiae Pulliat ex Planchon, 1883
(Vigne de coignet)

Identifiants : 40860/vitcoi

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 04/06/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Rosidées ;***
    - ***Ordre : Vitales ;***
    - ***Famille : Vitaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Rhamnales ;***
    - ***Famille : Vitaceae ;***
    - ***Genre : Vitis ;***
- ***Synonymes français : vigne du Japon ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : crimson glory vine, yama-budo , Meogu, Meolgu, Meoru, Yama-budo ;***

- ***Note comestibilité : ****
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Partie(s) comestible(s)$^{\{\{\{0(+x)}$: fruit, feuilles, tige, pousses$^{\{\{\{0(+x)}$.

  Utilisation(s)/usage(s)$^{\{\{\{0(+x)}$ culinaire(s) :

  -les fruits sont consommés crus ; ils sont également infusés dans du vin ;

  -les jeunes tiges et les pétioles sont bouillis et mangés$^{\{\{\{0(+x)}$; feuilles cuites (ex. : comme potherbe) ? (qp*).

  Les fruits mûrs sont consommés crus. Ils sont également brassés en vin. Les jeunes tiges et les tiges des feuilles sont bouillies et mangées

  néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

    - ***Distribution :***

C'est une plante tempérée. Il fait mieux dans les sols bien compostés, humides et bien drainés. Il a besoin d'une position ouverte et ensoleillée. Il est résistant au gel. Il convient aux zones de rusticité 5-9. Arboretum Tasmania. Jardins botaniques du mont Lofty{{{0(+x) (traduction automatique)}.

Original : It is a temperate plant. It does best in well-composted, moist and well-drained soils. It needs an open, sunny position. It is frost hardy. It suits hardiness zones 5-9. Arboretum Tasmania. Mt Lofty Botanical Gardens{{{0(+x)}.

- ***Localisation :***

  *Asie, Australie, Canada, Japon *, Corée, Amérique du Nord, Tasmanie{{{0(+x) (traduction automatique)}.*

  Original : Asia, Australia, Canada, Japan, Korea, North America, Tasmania{{{0(+x)}.*

- ***Notes :***

  Il existe 60 à 70 espèces de Vitis{{{0(+x) (traduction automatique)}.

  Original : There are 60 to 70 species of Vitis{{{0(+x)}.

- ***Liens, sources et/ou références :***

  - *[5]"Plants For a Future" (en anglais) :* https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Vitis_coignetiae *;*

    dont classification :

  - *"The Plant List" (en anglais) :* www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2456654 *;*

    dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais) ;

    dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

    Chen, B. & Qiu, Z., Consumer's Attitudes towards Edible Wild Plants, Ishikawa Prefecture, Japan. p 26 www.hindawi.com/journals/ijfr/aip/872413.pdf ; Cundall, P., (ed.), 2004, Gardening Australia: flora: the gardener's bible. ABC Books. p 1478 (Fruit said to be inedible) ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 245 ; Flowerdew, B., 2000, Complete Fruit Book. Kyle Cathie Ltd., London. p 92 ; Hibbert, M., 2002, The Aussie Plant Finder 2002, Florilegium. p 308 ; Joyce, D., 1998, The Garden Plant Selector. Ryland, Peters and Small. p 188 (fruit described as inedible) ; Lord, E.E., & Willis, J.H., 1999, Shrubs and Trees for Australian gardens. Lothian. p 339 ; Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; Ryan, S., 2008, Dicksonia. Rare Plants Manual. Hyland House. p 79 ; Tanaka, ; Vigne Amer. Vitic. Eur. 7:186. 1883