Warburgia salutaris (G.Bertol.) Chiov., 1937

Identifiants : 40972/warsal

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 03/06/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Magnoliidées ;***
    - ***Ordre : Canellales ;***
    - ***Famille : Canellaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Magnoliales ;***
    - ***Famille : Canellaceae ;***
    - ***Genre : Warburgia ;***
- ***Synonymes : Chibaca salutaris Bertol f, Warburgia ugandensis non Sprague, Warburgia breyeri Pott ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : pepperbark tree, peperbasboom, molaka, mulanga, isibaha , Chibaha, Isibaha, Muranga ;***
- ***Rusticité (résistance face au froid/gel) : zone 10-12 ;***

- ***Note comestibilité : ****
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  -les feuilles sont utilisées pour aromatiser les soupes et les currys ; les feuilles ont un goût amer, brûlant et aromatique ; les feuilles sont utilisées comme thé ; -l'écorce contient du mannitol[{{{5(+)}. Les feuilles sont parfois ajoutées aux currys. Ils ont un goût poivré

  néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Note médicinale : *****
- ***Usages médicinaux : L'arbre à écorce de poivre est un remède à base de plantes largement utilisé en Afrique australe. L'écorce interne a de nombreuses utilisations comme traitement contre le paludisme, le rhume, les douleurs thoraciques, la toux, la diarrhée, les douleurs musculaires, les maux d'estomac et les douleurs corporelles générales [392]. Les tiges amères et l'écorce de racine ressemblant à du poivre sont utilisées pour soigner un large éventail de maladies. Ils sont utilisés comme expectorant pour traiter le rhume. On pense que la prise orale guérit les taches dans les poumons [295]. Les tiges et l'écorce des racines sont un remède contre le paludisme [295]. En poudre et mélangés à de l'eau, on pense qu'ils guérissent les plaies dans la bouche [295]. Séchées et moulues, elles sont prises comme un tabac à priser pour dégager les sinus [295]. ;***
- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

Par JMK, via wikimedia

- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - ***Distribution :***

    Une plante tropicale. Il pousse dans la forêt à feuilles persistantes. C'est souvent dans des endroits rocheux et sableux[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : A tropical plant. It grows in evergreen forest. It is often in rocky and sandy places[{{{0(+x)].

  - ***Localisation :***

    Afrique, Botswana, Afrique de l'Est, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Afrique australe, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : Africa, Botswana, East Africa, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Southern Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe[{{{0(+x)].

  - ***Notes :***

    L'écorce est utilisée comme tonique. Il est utilisé en médecine. Il existe 3 espèces de Warburgia[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : The bark is used for a tonic. It is used in medicine. There are 3 species of Warburgia[{{{0(+x)].

- ***Liens, sources et/ou références :***

  - ***[5]"Plants For a Future" (en anglais) :*** https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Warburgia_salutaris ***;***

    dont classification :

  - ***"The Plant List" (en anglais) : [0]www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2465886 ;***
    dont biographie (en anglais) de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

    Marinelli, J. (Ed), 2004, Plant. DK. p 127 ; Nouvo Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 44:683. 1937 ; Palgrave, K.C., 1996, Trees of Southern Africa. Struik Publishers. p 618 ; Palmer, E and Pitman, N., 1972, Trees of Southern Africa. Vol. 3. A.A. Balkema, Cape Town p 1523 ; Peters, C. R., O'Brien, E. M., and Drummond, R.B., 1992, Edible Wild plants of Sub-saharan Africa. Kew. p 75 ; Swaziland's Flora Database http://www.sntc.org.sz/flora ; van Wyk, B, van Wyk, P, and van Wyk B., 2000, Photographic guide to Trees of Southern Africa. Briza. p 318 ; van Wyk, B-E., 2011, The potential of South African plants in the development of new food and beverage products. South African Journal of Botany 77 (2011) 857â€“868 ; White, F., Dowsett-Lemaire, F. and Chapman, J. D., 2001, Evergreen Forest Flora of Malawi. Kew. p 179 ; www.worldagroforestrycentre.org/treedb/