

Costus guanaiensis Rusby, 1902 (Gingembre spirale)

Identifiants : 9595/cosgua

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 23/04/2024

- **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Monocotylédones ;
- Clade : Commelinidées ;
- Ordre : Zingiberales ;
- Famille : Costaceae ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Liliopsida ;
- Ordre : Zingiberales ;
- Famille : Costaceae ;
- Genre : Costus ;

- **Synonymes :** Costus sinningiiflorus Rusby ;

- **Synonymes français :** canahuate, cana d'Inde ;

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** canahuate ;

- **Rusticité (résistance face au froid/gel) :** -10°C ;



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Feuille (extrait^(dp)) tiges^{0(12(+x),+x)} {jus^{12(+x)}} [base^(dp)] boissons/brevages^{{{(12(+x))}}} et fleur (fleurs^{0(12(+x))}) comestibles^{0(+x)}.

Détails :

Les tiges donnent un très savoureux jus acidulé qui peut être consommé tel quel ou transformé en une boisson rafraîchissante par adoucissement avec du sucre. Les fleurs sont également comestibles, ayant le même goût que le jus pressé des tiges^{{{(12(+x))}}}.

Les tiges ont un jus acide savoureux. Il est transformé en boisson en ajoutant du sucre. Les fleurs sont également consommées crues



néant, inconnus ou indéterminés. néant, inconnus ou indéterminés.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



De gauche à droite :

Par Reinaldo Aguilar, via flickr

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

Une plante tropicale. Il pousse dans des fourrés humides à humides. À Porto Rico, il pousse entre 90 et 860 m au-dessus du niveau de la mer^{{{{0(+x)}} (traduction automatique)}}.

Original : A tropical plant. It grows in moist to wet thickets. In Puerto Rico is grows between 90-860 m above sea level^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

Asie, Bolivie, Brésil, Caraïbes, Amérique centrale, Colombie, Équateur *, Guyane, Guyane, Guyane, Mexique, Amérique du Nord, Panama, Porto Rico, Asie du Sud-Est, Singapour, Slovénie, Amérique du Sud, Suriname, Trinidad, Venezuela^{{{{0(+x)}} (traduction automatique)}}.

Original : Asia, Bolivia, Brazil, Caribbean, Central America, Colombia, Ecuador*, Guiana, Guianas, Guyana, Mexico, North America, Panama, Puerto Rico, SE Asia, Singapore, Slovenia, South America, Suriname, Trinidad, Venezuela^{{{{0(+x)}}}}.

- **Notes :**

Il existe environ 40 à 90 espèces de Costus. Ils poussent sous les tropiques. Peut-être dans une maison chaude en Slovénie^{{{{0(+x)}} (traduction automatique)}}.

Original : There are about 40-90 Costus species. They grow in the tropics. Possibly in a hot house in Slovenia^{{{{0(+x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- **"The Plant List" (en anglais) :** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-234648 ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Facciola, S., 1998, *Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants*. Kampong Publications, p 83