

***Diospyros whyteana* (Hiern) P.White, 1961 (Micocoulier)**

Identifiants : 11790/diowhy

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 18/04/2024

- **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Ordre : Ericales ;
- Famille : Ebenaceae ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Ebenales ;
- Famille : Ebenaceae ;
- Genre : Diospyros ;

- **Synonymes : *Royena goetzei* Gurke, *Royena lucida* L, *Royena lucida* var. *whyteana* De Winter & Brenan, *Royena nyassae* Gurke, *Royena whyteana* Hiern, *Royena wilmsii* Gurke ;**

- **Synonymes français : café sauvage, staphylier, bladdernut ;**

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : bladder nut , Nyapahuro, Nyatsipa, Santinyana, Silevusembuti ;**

- **Rusticité (résistance face au froid/gel) : zone 9 ;**



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Fruit^{0(+x)} (pulpe/chair^{{{(dp*)}}} ; et graines^{0(+x)} torréfiées [base boissons/brevages^{{{(dp*)}}} {substitut café^{{{0(+x)}}}}}) comestible^{0(+x)}.

Détails :

Les fruits ont peu de saveur^{{{0(+x)}}}.

Les fruits sont mangés. Ils ont peu de saveur. Les graines sont utilisées comme succédané du café



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



Par Edwards's Botanical Register (vol. 32: t. 40, 1846) [Miss. Drake], via plantillustrations.org

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Statut :**

Le fruit n'a pas beaucoup de saveur^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : *The fruit don't have much flavour*^{{{0(+x)}}}.

- **Distribution :**

Une plante tropicale. Les jeunes plantes ont besoin d'une protection contre le gel. Il est tolérant à la sécheresse une fois établi. Dans les jardins botaniques de Wittunga Adélaïde. Il convient aux zones de rusticité 10-11. Jardins botaniques de Melbourne^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : *A tropical plant. Young plants need frost protection. It is tolerant to drought once established. In Wittunga Botanical Gardens Adelaide. It suits hardiness zones 10-11. Melbourne Botanical gardens*^{{{0(+x)}}}.

- **Localisation :**

Afrique, Australie, Afrique de l'Est, Eswatini, Éthiopie, Lesotho, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud, Afrique australe, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : *Africa, Australia, East Africa, Eswatini, Ethiopia, Lesotho, Malawi, Mozambique, South Africa, Southern Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe*^{{{0(+x)}}}.

- **Notes :**

Il existe environ 485 espèces de Diospyros principalement sous les tropiques^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}.

Original : *There are about 485 species of Diospyros mostly in the tropics*^{{{0(+x)}}}.

- **Nombre de graines au gramme : 6 ;**

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2770741 ;
- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=403629> ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Bothalia 7:458. 1961 ; Etherington, K., & Imwold, D., (Eds), 2001, *Botanica's Trees & Shrubs. The illustrated A-Z of over 8500 trees and shrubs*. Random House, Australia. p 264 ; Facciola, S., 1998, *Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants*. Kampong Publications, p 92 ; Joffe, P., 2007, *Creative Gardening with Indigenous Plants. A South African Guide*. Briza. p 55 ; Long, C., 2005, *Swaziland's Flora - siSwati names and Uses*

<https://www.sntc.org.sz/flora/> ; Plowes, N. J. & Taylor, F. W., 1997, *The Processing of Indigenous Fruits and other Wildfoods of Southern Africa*. in Smartt, L. & Haq. (Eds) *Domestication, Production and Utilization of New Crops*. ICUC p 190 ; Schmidt, E., Lotter, M., & McClelland, W., 2007, *Trees and shrubs of Mpumalanga and Kruger National Park*. Jacana Media p 518 ; Tredgold, M.H., 1986, *Food Plants of Zimbabwe*. Mambo Press. p 99 ; van Wyk, B, van Wyk, P, and van Wyk B., 2000, *Photographic guide to Trees of Southern Africa*. Briza. p 120 ; Venter, F & J., 2009, *Making the most of Indigenous Trees*. Briza. p 130 ; von Breitenbach, F., 1985, *Southern Cape Tree Guide*. Department of Environment Affairs, Forestry Branch. Pamphlet 360 Pretoria p 26 ; White, F., Dowsett-Lemaire, F. and Chapman, J. D., 2001, *Evergreen Forest Flora of Malawi*. Kew. p 227 ; www.zimbabweflora.co.zw 2011