Encephalartos longifolius (Jacq.) Lehm.

Identifiants : 12697/enclon

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 08/05/2024

- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Cycadophyta ;***
    - ***Classe : Cycadopsida ;***
    - ***Ordre : Cycadales ;***
    - ***Famille : Zamiaceae ;***
    - ***Genre : Encephalartos ;***
- ***Synonymes : Zamia longifolius Jacq ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Suurberg cycad, , Suurbergbroodboom ;***
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Parties comestibles : tige - amidon[{{{0(+x) (traduction automatique)] | Original : Stem - starch[{{{0(+x) L'amidon de la moelle de la tige est utilisé pour faire une farine pour le pain après le traitement. La préparation comprenait son enterrement pendant 2 mois avant la cuisson. Pendant ce temps, il a fermenté. La pulpe autour des graines est signalée comme étant comestible. ATTENTION: les noyaux sont très toxiques

  cf. consommation

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***
- ***Liens, sources et/ou références :***

  dont classification :

  dont livres et bases de données : [0]"Food Plants International" (en anglais) ;

  dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  Fox, F. W. & Young, M. E. N., 1982, Food from the Veld. Delta Books. p 370 ; Jones, D.L., 2000, Cycads of the world. Reed New Holland. p 206 ; Marinelli, J. (Ed), 2004, Plant. DK. p 370 ; Nov. stirp. pug.. 6:14. 1834 ; van Wyk, B, van Wyk, P, and van Wyk B., 2000, Photographic guide to Trees of Southern Africa. Briza. p 129 ; van Wyk, Be., & Gericke, N., 2007, People's plants. A Guide to Useful Plants of Southern Africa. Briza. p 86