

Eugenia reinwardtiana (Blume) A.Cunn. ex DC., 1828 (Cedar bay cherry)

Identifiants : 13464/eugrei

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 06/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Malvidées ;
- Ordre : Myrtales ;
- Famille : Myrtaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Myrtales ;
- Famille : Myrtaceae ;
- Genre : Eugenia ;

- Synonymes : *Eugenia carissoides* F. Muell, *Eugenia hypospodia* F. Muell, *Eugenia kangeanensis* Valetton, *Eugenia koolauensis* var. *glabra* O. Deg, *Eugenia macrohila* C.T.White & W.D.Francis, *Eugenia rariflora* Benth, *Eugenia rariflora* var. *parvifolia* Hillebr, *Eugenia reinwardtiana* f. *lutea* H.St.John, *Eugenia waianensis* O.Deg, *Jossinia reinwardtiana* (Blume) Blume, *Jossinia tahitensis* Nadeaud, *Myrtus reinwardtiana* Blume, dont homonymes : *Eugenia reinwardtiana* (Blume) DC. 1828 ;

- Synonymes français : beach cherry ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : sweet cherry, beach cherry, cedar bay cherry , Agashiru, Pohon jambu ceri pantai, Unuoi ;

- Rusticité (résistance face au froid/gel) : 0/-1°C ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit^{0(+x)} (fruits^(dp*) {chair^{0(+x)}/pulpe et peau^{{{(dp*)}}}}) comestible^{0(+x)}.

Détails :

La chair du fruit est consommée^{{{(0(+x))}}}. La peau est-elle bien comestible et consommable ? (qp*)

La chair du fruit est mangée. Il peut être utilisé pour les confitures et les sauces

Partie testée : fruit^{{{(0(+x))}}} (traduction automatique)

Original : Fruit^{{{(0(+x))}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
70.8	309	74	1.9	0	0	1.1	1.1



ATTENTION : les graines ne doivent pas être consommées car il se peut qu'elles provoquent la diarrhée. ATTENTION : les graines ne doivent pas être consommées car il se peut qu'elles provoquent la diarrhée^{{{0(+x)}}}.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



De gauche à droite :

Par Arthur Chapman, via flickr

Par D.Eickhoff, via flickr

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Statut :**

Les fruits sont riches en vitamine C^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : Fruit are rich in Vitamin C^{{{0(+x)}}}.

- **Distribution :**

Une plante tropicale. Il est originaire du nord-est de l'Australie. C'est une espèce de forêt tropicale humide. Il se produit souvent dans les broussailles côtières. Ils peuvent tolérer des vents chargés de sel. Ils nécessitent un sol bien drainé. Les arbres pousseront en plein soleil ou à l'ombre. Ils peuvent tolérer de très légères gelées. Dans les jardins botaniques de Cairns^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : A tropical plant. It is native to NE Australia. It is a tropical rainforest species. Often it occurs in coastal scrub. They can tolerate salt laden winds. They require a well drained soil. Trees will grow in full sunlight or heavy shade. They can tolerate very slight frosts. In the Cairns Botanical Gardens^{{{0(+x)}}}.

- **Localisation :**

American Samoa, Asia, Australia*, Brazil, Cook Islands, East Timor, Fiji, Hawaii, Indonesia, Marquesas, Micronesia, Niue, Pacific, Palau, Papua New Guinea, PNG, Samoa, SE Asia, South America, Timor-Leste, Tonga, Torres Strait, USA^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : American Samoa, Asia, Australia*, Brazil, Cook Islands, East Timor, Fiji, Hawaii, Indonesia, Marquesas, Micronesia, Niue, Pacific, Palau, Papua New Guinea, PNG, Samoa, SE Asia, South America, Timor-Leste, Tonga, Torres Strait, USA^{{{0(+x)}}}.

- **Notes :**

Il existe environ 550 espèces d'Eugenia. Ils se trouvent principalement en Amérique du Sud tropicale et subtropicale^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : There are about 550 Eugenia species. They are mostly in tropical and subtropical South America^{{{0(+x)}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-76601 ;
- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=452507> ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" ([*Eugenia reinwardtiana* (Blume) DC.], en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Barwick, M., 2004, *Tropical and Subtropical Trees. A Worldwide Encyclopedic Guide*. Thames and Hudson p 175 ;
Cooper W & Cooper W T, 1994, *Fruits of the Rain Forest*. RD Press p 122 ; Cooper, W. and Cooper, W., 2004, *Fruits of the Australian Tropical Rainforest*. Nokomis Editions, Victoria, Australia. p 342 ; Elliot, W.R., & Jones, D.L., 1992, *Encyclopedia of Australian Plants suitable for cultivation*. Vol 4. Lothian. p 246 ; Facciola, S., 1998, *Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants*. Kampong Publications, p 157 ; Hibbert, M., 2002, *The Aussie Plant Finder 2002, Florilegium*. p 99 ; INFOODSUpdatedFGU-list.xls ; Jackes, B.R., 2001, *Plants of the Tropics. Rainforest to Heath. An Identification Guide*. James Cook University. p 68 ; Jones D, L, 1986, *Ornamental Rainforest Plants in Australia*, Reed Books, p 69, 340 ; Lorenzi, H., Bacher, L., Lacerda, M. & Sartori, S., 2006, *Brazilian Fruits & Cultivated Exotics*. Sao Paulo, Instituto Plantarum de Estudos da Flora Ltda. p 456 ; Molyneux, B. and Forrester, S., 1997, *The Austraflo A-Z of Australian Plants*. Reed. p 95 ; Nicholson, N & H., 1996, *Australian Rainforest Plants 3, Terania Rainforest Publishing*. NSW. p 28 ; Paczkowska, G. & Chapman, A.R., 2000, *The Western Australian Flora. A Descriptive Catalogue*. Western Australian Herbarium. p 386 ; Radke, P & A, Sankowsky, G & N., 1993, *Growing Australian Tropical Plants*. Frith & Frith, Australia. p 36 ; Tanaka, ; Townsend, K., 1994, *Across the Top. Gardening with Australian Plants in the tropics*. Society for Growing Australian Plants, Townsville Branch Inc. p 207 ; Wheeler, J.R.(ed.), 1992, *Flora of the Kimberley Region*. CALM, Western Australian Herbarium, p 531 ; Whistler, W.A., 2004, *Rainforest Trees of Samoa*. Isle Botanica Honolulu, Hawaii. p 116 ; Williams, K.A.W., 1999, *Native Plants of Queensland Volume 4*. Keith A.W. Williams North Ipswich, Australia. p 190