

Hordeum murinum L., 1753 (Orge des rats)

Identifiants : 16217/hormur

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 05/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Monocotylédones ;
- Clade : Commelinidées ;
- Ordre : Poales ;
- Famille : Poaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Liliopsida ;
- Ordre : Cyperales ;
- Famille : Poaceae ;
- Genre : Hordeum ;

- Synonymes : *Hordeum boreale* Gand, *Hordeum coleophorum* Phil, *Hordeum delphicum* Gand, *Hordeum depilatum* Gand, *Hordeum elongatum* Gand, *Hordeum flexicaule* Gand, *Hordeum hohenacheri* Gand, *Hordeum microcladum* Gand, *Hordeum murinum* subsp. *leporinum* (Link) Arcang, *Hordeum neglectum* Gand, *Hordeum rubens* Willk ;
- Synonymes français : orge des souris, orge queue-de-souris (orge queue de souris), orge queue-de-rat, orge des murs (à éviter car résultat de la confusion entre "murinum" et "murorum"), orge sauvage, orge à deux rangs, orge des lièvres [subsp. *leporinum*], orge glauque [subsp. *glaucum*] ;
- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : mouse barley, barley grass, wall barley, sha-eer, loica, false barley [subsp. *murinum*], false barley, farmer's-foxtail [subsp. *murinum*], mouse barley [subsp. *leporinum*], smooth barley [subsp. *glaucum*], wall barley [subsp. *murinum*], wall barley, way barley [subsp. *murinum*], wild barley, mugi-kusa (jp romaji), cevada-de-ponche-verde (pt,br), cevada-dos-ratos (pt,br), harkorn [subsp. *leporinum*] (sv), spådkorn [subsp. *glaucum*] (sv), vildkorn (sv) ;



- Note comestibilité : **
- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit (graines^{0(+x),27(+x)} cuites^{0(+x)} nourriture/aliment {céréale secondaire^{(((dp*))} : farine^{0(+x),27(+x)}} et base boissons/brevages^{(((dp*))} {malt : bière^{(((27(+x)))}}} comestible^{0(+x)}.(1*)

Détails :

Graines, céréale^{(((0(+x)))}. Les graines sont consommées cuites sous forme de farine^{(((0(+x))),{{{(-27(+x))dp*}}}, et utilisées comme source de malt à la base de la bière^{(((27(+x)))}.(1*)

Les graines sont consommées cuites sous forme de farine. Attention: Il a des arêtes grossières acérées qui peuvent irriter la bouche



(1*)ATTENTION : les arêtes grossières, autour des graines, sont pointues ce qui peut irriter la bouche ; sans préparation

adéquates, elles peuvent se frayer un chemin dans les gencives et le tube digestif, ce qui arrive, par exemple, chez les animaux, provoquant, là aussi, une irritation et une inflammation ; enfin, elles peuvent également se retrouver dans les oreilles et les yeux, entraînant parfois la cécité et même la mort.(1*)ATTENTION^{0(+x)} : les arêtes^{{{0(5(+),+x)}}} grossières^{0(+x)}, autour des graines^{{{5(+)}}}, sont pointues ce qui peut irriter la bouche^{{{0(+x)}}} ; sans préparation adéquates^{{{(dp)}}}, elles peuvent se frayer un chemin dans les gencives et le tube digestif, ce qui arrive, par exemple, chez les animaux, provoquant, là aussi, une irritation et une inflammation ; enfin, elles peuvent également se retrouver dans les oreilles et les yeux, entraînant parfois la cécité et même la mort^{{{5(+)}}}.

- Note médicinale : *

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):



De gauche à droite :

Par Curtis W. (Flora Londinensis, vol. 5: t. 9, 1784-1788), via plantillustrations

Par Kops et al. J. (Flora Batava, vol. 5: t. 357, 1828), via plantillustrations

Par Klein L. (Unsere Unkräuter, Zweite Auflage, t. 93, 1926) [L. Bartning], via plantillustrations

- Autres infos :

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- Distribution :

C'est une plante tempérée. Il se produit dans les pâturages et peut être dans des endroits salés. En Argentine, il passe du niveau de la mer à 2300 m au-dessus du niveau de la mer^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : It is a temperate plant. It occurs in pastures and can be in salty locations. In Argentina it grows from sea level to 2,300 m above sea level^{{{0(+x)}}}.

- Localisation :

Africa, Argentina, Australia, Bahrain, Chile, Easter Island, Europe, Falklands, France, Greece, Hungary, Italy, Mediterranean, Mexico, New Zealand, Norfolk Island, North Africa, North America, Pakistan, Portugal, Slovenia, South Africa, Southern Africa, South America, Spain, Tasmania, USA^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : Africa, Argentina, Australia, Bahrain, Chile, Easter Island, Europe, Falklands, France, Greece, Hungary, Italy, Mediterranean, Mexico, New Zealand, Norfolk Island, North Africa, North America, Pakistan, Portugal, Slovenia, South Africa, Southern Africa, South America, Spain, Tasmania, USA^{{{0(+x)}}}.

- Notes :

Il existe environ 20 espèces de Hordeum^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : There are about 20 Hordeum species^{{{0(+x)}}}.

- Liens, sources et/ou références :

- Tela Botanica : <https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-34857> ;

- 5^e "Plants For a Future" (en anglais) : <https://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Hordeum+murinum> ;

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-419414 ;
- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=19314> ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais), 27 Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 158, par Louis Bubenicek) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Cent. pl. II:8. 1756 (Amen. acad. 4:304. 1759) ; Davies, C. L., Waugh, D. L. & Lefroy, E. C., 2005, Perennial Grain Crops for High Water Use. The case of *Microlaena stipoides*. RIRDC Publication No. 05/024 ; Davis, S.D., Heywood, V.H., & Hamilton, A.C. (eds), 1994, Centres of plant Diversity. WWF. Vol 2. p 340 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 176 ; Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. <https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/> ; Royal Botanic Gardens, Kew (1999). Survey of Economic Plants for Arid and Semi-Arid Lands (SEPASAL) database. Published on the Internet; <https://www.rbgekew.org.uk/ceb/sepasal/internet> [Accessed 3rd June 2011] ; Tanaka,