

Hypholoma sublateritium (Fr.) Quel.

Identifiants : 16585/hyphsubl

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 10/05/2024

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Fungi ;
- Division : Basidiomycota ;
- Classe : Agaricomycetes ;
- Ordre : Agaricales ;
- Famille : Strophariaceae ;
- Genre : Hypholoma ;

- Synonymes : Naematoloma sublateritium ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Brick Cap, Perplexing hypholoma, Chestnut mushroom, Kuri-take, ;

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Parties comestibles : champignon^{{{0(+x)}} (traduction automatique)} | Original : Fungus, Mushroom^{{{0(+x)}}} Mise en garde; Il est normalement très amer et non comestible. ATTENTION: C'est un poison. Les organes de fructification sont bouillis et mangés ou utilisés dans les soupes. Ils sont normalement traités au vinaigre avant la cuisson. Des formes cultivées sont disponibles



cf. consommation

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

- Liens, sources et/ou références :

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 253 ; Fuhrer, B & Robinson, R., 1992, Rainforest Fungi of Tasmania and SE Australia, CSIRO p 37 ; Fuhrer, B., 2005, A field guide to Australian Fungi. Bloomings Books. p 97 ; Jordan, P., 2000, The Mushroom Guide and Identifier, Hermes House, p 60 ; Pace, G., 1998, Mushrooms of the world. Firefly books. p 56 (Not edible) ; Tanaka, ; Uphof,