

Annona stenophylla Engl. & Diels

Identifiants : 2604/annste

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 17/04/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Magnoliidées ;
- Ordre : Magnoliales ;
- Famille : Annonaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Magnoliales ;
- Famille : Annonaceae ;
- Genre : Annona ;

- Synonymes : x (=) basionym, *Annona friesii* Robyns & Ghesq, *Annona friesii* var. *elongata* Robyns & Ghesq, *Annona stenophylla* var. *nana* R. E. Fr ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : , Maroro, Mfila, Mshofu, Mtopetope, Muroro, Omutyaalale ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Parties comestibles : fruit^{{{0(+x)}} (traduction automatique)} | Original : Fruit^{{{0(+x)}}} La pulpe du fruit mûr est consommée crue ou cuite. Les fruits mûrs sont trempés dans l'eau, puis pressés et filtrés pour obtenir du jus

Partie testée : fruit^{{{0(+x)}} (traduction automatique)}

Original : Fruit^{{{0(+x)}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
	0	0	0	0	0	0	0



(1*) Les graines, comme celles de toutes les espèces du genre *Annona*, sont toxiques et il faut prendre soin de les retirer de la pulpe avant qu'elle ne soit mécaniquement mélangée (mixée). (1*) Les graines, comme celles de toutes les espèces du genre *Annona*, sont toxiques et il faut prendre soin de les retirer de la pulpe avant qu'elle ne soit mécaniquement mélangée (mixée)^{{{67}}}.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

- Liens, sources et/ou références :

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Cheikhoussef, A & Embashu, W., 2013, *Ethnobotanical knowledge on Indigenous fruits in Ohangwena and Oshana regions in Northern Namibia*. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 9:34 ; *Flora Zambesiaca*. <http://apps.kew.org/efloras> ; Fox, F. W. & Young, M. E. N., 1982, *Food from the Veld*. Delta Books. p 82 ; Lee, 1979, ; Maguire, 1978, ; Marshall, 1976, ; Maundu, P. et al, 1999, *Traditional Food Plants of Kenya*. National Museum of Kenya. 288p ; Maroyi, A., 2011, *The Gathering and Consumption of Wild Edible Plants in Nhema Communal Area, Midlands Province, Zimbabwe*. *Ecology of Food and Nutrition* 50:6, 506-525 ; Palmer, E and Pitman, N., 1972, *Trees of Southern Africa*. Vol. 1. A.A. Balkema, Cape Town p 587 ; Peters, C. R., O'Brien, E. M., and Drummond, R.B., 1992, *Edible Wild plants of Sub-saharan Africa*. Kew. p 54 ; Ruffo, C. K., Birnie, A. & Tengnas, B., 2002, *Edible Wild Plants of Tanzania*. RELMA p 138 ; Tredgold, M.H., 1986, *Food Plants of Zimbabwe*. Mambo Press. p 84 ; Wild, 1975,