

***Pseudospondias microcarpa* (A.Rich.) Engl., 1883 (Raisin d'Afrique)**

Identifiants : 26093/psemic

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 12/05/2024

- **Classification phylogénétique :**

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Malvidées ;
- Ordre : Sapindales ;
- Famille : Anacardiaceae ;

- **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Sapindales ;
- Famille : Anacardiaceae ;
- Genre : *Pseudospondias* ;

- **Synonymes : *Spondias microcarpa* A. Rich, *Spondias zanzee* G. Don ;**

- **Synonymes français : arbre à raisin d'Afrique ;**

- **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : African grape tree , Agombe, Bololo, Byungu, Doleke, Chungu, Doweï, Dueke, Ewungu, Iyungu, Ka-dibia, Katawani, Kyungu, Mbolu, Mubulu, Muziru, Nyibu, Ochol, Pela, Pohon anggur afrika, Sana, Wungu ;**



- **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Partie(s) comestible(s)^{{{0(+x)}}} : feuilles, fruit^{{{0(+x)}}}.

Utilisation(s)/usage(s)^{{{0(+x)}}} **culinaire(s) :** le fruit est consommé cru^{{{0(+x)}}} ; feuilles cuites (ex. : comme potherbe) ? (qp*).(1*)

Le fruit est consommé cru

Partie testée : fruit^{{{0(+x)}}} (traduction automatique)

Original : Fruit^{{{0(+x)}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
77.1	0	0	0	0	3.0	0.9	0



néant, inconnus ou indéterminés. néant, inconnus ou indéterminés.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**

- *Autres infos :*

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

◦ Statut :

Il est raisonnablement consommé en Afrique de l'Ouest. Les fruits sont surtout consommés par les enfants^{{{0(+x)}}}
(traduction automatique)

Original : It is reasonably commonly eaten in West Africa. The fruit are especially eaten by children^{{{0(+x)}}}.

◦ Distribution :

Une plante tropicale. Il pousse dans les basses terres. Il se produit sur les rives des lacs et à la lisière des forêts tropicales et dans les zones marécageuses des forêts tropicales. C'est courant en Afrique. En Tanzanie, il pousse entre 900 et 1700 m au-dessus du niveau de la mer. Il pousse dans les zones avec une pluviométrie comprise entre 1 200 et 2 100 mm^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : A tropical plant. It grows in the lowlands. It occurs on lake shores and rain-forest edges and in swampy areas in tropical forests. It is common in Africa. In Tanzania it grows between 900-1,700 m above sea level. It grows in areas with a rainfall between 1,200-2,100 mm^{{{0(+x)}}}.

◦ Localisation :

*Afrique *, Angola, Asie, Burkina Faso, Cameroun, Afrique centrale, République centrafricaine, RCA, RD Congo, Congo R, Côte d'Ivoire, Afrique de l'Est, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée, Guinée-Bissau, Indonésie, Côte d'Ivoire, Kenya, Libéria, Mozambique, Nigéria, Sao Tomé-et-Principe, Asie du Sud-Est, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Afrique de l'Ouest, Zambie*^{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : Africa, Angola, Asia, Burkina Faso, Cameroon, Central Africa, Central African Republic, CAR, Congo DR, Congo R, C te d'Ivoire, East Africa, Gabon, Ghana, Guinea, Guin e, Guinea-Bissau, Indonesia, Ivory Coast, Kenya, Liberia, Mozambique, Nigeria, Sao Tome and Principe, SE Asia, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Uganda, West Africa, Zambia*^{{{0(+x)}}}.

• Liens, sources et/ou r f rences :

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2407084 ;

dont livres et bases de donn es : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/r f rences de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Ambe, G., 2001, Les fruits sauvages comestibles des savanes guineennes de Cote-d'Ivoire:  tat de la connaissance par une population locale, les Malinke. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 5(1), 43-48 ; Dalziel, J. M., 1937, The Useful plants of west tropical Africa. Crown Agents for the Colonies London. ; Hedrick, U.P., 1919, (Ed.), Sturtevant's edible plants of the world. p 530 ; Jardin, C., 1970, List of Foods Used In Africa, FAO Nutrition Information Document Series No 2.p 96, 157 ; Katende, A.B., Birnie, A & Tengnas B., 1995, Useful Trees and Shrubs for Uganda. Identification, Propagation and Management for Agricultural and Pastoral Communities. Technical handbook No 10. Regional Soil Conservation Unit, Nairobi, Kenya. p 518 ; Lovett, J. C. et al, Field Guide to the Moist Forest Trees of Tanzania. p 10 ; Martin, F.W. & Ruberte, R.M., 1979, Edible Leaves of the Tropics. Antillian College Press, Mayaguez, Puerto Rico. p 174, 217 ; Martin, F. W., et al, 1987, Perennial Edible Fruits of the Tropics. USDA Handbook 642 p 14 ; Okigbo, B.N., Vegetables in Tropical Africa, in Opena, R.T. & Kyomo, M.L., 1990, Vegetable Research and development in SADCC countries. Asian Vegetable Research and development Centre. Taiwan. p 38, 46 ; Peters, C. R., O'Brien, E. M., and Drummond, R.B., 1992, Edible Wild plants of Sub-Saharan Africa. Kew. p 50 ; Raponda-Walker, A & Sillans, R., 1961, Les Plantes Utiles du Gabon. Editions Paul Lechevalier, Paris. p 60 ; Ruffo, C. K., Birnie, A. & Tengnas, B., 2002, Edible Wild Plants of Tanzania. RELMA p 546 ; Savill, P. S. & Fox, J. E. D., Trees of Sierra Leone. p 37 ; Tanno, T., 1981, Plant Utilization of the Mbuti Pygmies: With Special reference to their Material Culture and Use of Wild Vegetable Foods. Kyoto University Research. African Study Monographs 1:1-53 ; Termote, C., et al, 2011, Eating from the wild: Turumbu, Mbole and Bali traditional knowledge of non-cultivated edible plants, District Tshopo, DR Congo, Gen Resourc Crop Evol. 58:585-618