

Sambucus racemosa L., 1753 (Sureau à grappes)

Identifiants : 28965/samrac

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 04/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Clade : Campanulidées ;
- Ordre : Dipsacales ;
- Famille : Adoxaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Dipsacales ;
- Famille : Adoxaceae ;
- Genre : Sambucus ;

- Synonymes : Sambucus pubens, ;

- Synonymes français : sureau rouge ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : red elder, red-berried elder, Alpine elder , Cheren baz, Syoeu ridzo ;

- Rusticité (résistance face au froid/gel) : -29°C ;



- Note comestibilité : ***

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Partie(s) comestible(s)^{{{{0(+x)}}} : fleurs, fruit^{{{{0(+x)}}μ}.

Utilisation(s)/usage(s)^{μ{{{0(+x)}}} culinaires : les fruits sont consommés après cuisson ; ils sont cuits avec du sucre ; ils sont utilisés pour les jus, confitures et gelées ;

les fruits sont cuits et séchés et stockés^{{{{0(+x)}}}.

Les fruits sont consommés après la cuisson. Ils sont cuits avec du sucre. Ils sont utilisés pour les jus, les gelées et les confitures. Les fruits sont cuits, séchés et conservés. Les fleurs sont utilisées pour aromatiser

Partie testée : fruits crus^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)

Original : Fruit raw^{{{{0(+x)}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro- vitamines A (μg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
78	472	113	1.1	0	36.7	1.1	0.5



néant, inconnus ou indéterminés. néant, inconnus ou indéterminés.

- Note médicinale : **

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):



De gauche à droite :

Par Oeder, G.C., *Flora Danica* (1761-1861) Fl. Dan. vol. 17 (1877-1883) [tt. 2881-3060] t. 2951, via plantillustrations

Par Klein, L., *Unsere Waldbäume, Sträucher und Zwergholzgewächse* (1910) t. 100, via plantillustrations

Par Duhamel du Monceau, H.L., *Traité des arbres et arbustes, Nouvelle édition [Nouveau Duhamel]* (1800-1819) *Traité arbr. arbust.*, ed. 2 vol. 1 (1800) t. 56, via plantillustrations

- Autres infos :

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- Distribution :

C'est une plante tempérée. Il fait mieux dans les sols humides et bien drainés. Il a besoin d'une position ombragée protégée. Il est résistant au gel. Il est sensible à la sécheresse. Il convient aux zones de rusticité 4-9. Arboretum Tasmania^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : It is a temperate plant. It does best in moist, well-drained soils. It needs a protected shady position. It is frost hardy. It is sensitive to drought. It suits hardiness zones 4-9. Arboretum Tasmania^{{{{0(+x)}}}.

- Localisation :

Alaska, Arménie, Asie, Australie, Autriche, Balkans, Bosnie, Grande-Bretagne, Bulgarie, Canada, Caucase, Chine, Europe *, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Japon, Amérique du Nord, Russie, Scandinavie, Sibérie, Slovénie, Suisse, Tasmanie, Turquie^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : Alaska, Armenia, Asia, Australia, Austria, Balkans, Bosnia, Britain, Bulgaria, Canada, Caucasus, China, Europe*, Finland, Georgia, Greece, Hungary, Japan, North America, Russia, Scandinavia, Siberia, Slovenia, Switzerland, Tasmania, Turkey^{{{{0(+x)}}}.

- Notes :

Il existe environ 25 espèces de *Sambucus*. Ils sont également mis dans la famille des Caprifoliacées. Également mis dans la famille des Sambucacées^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique).

Original : There are about 25 *Sambucus* species. They are also put in the family Caprifoliaceae. Also put in the family Sambucaceae^{{{{0(+x)}}}.

- Liens, sources et/ou références :

- Pommiers.com : <https://www.pommiers.com/sureau/sureau.htm> ;

- "Plants For a Future" (en anglais) : https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Sambucus_racemosa ;

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2486552 ;

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Bodkin, F., 1991, *Encyclopedia Botanica*. Cornstalk publishing, p 906 ; Brickell, C. (Ed.), 1999, *The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants*. Convent Garden Books. p 930 ; Cundall, P., (ed.), 2004, *Gardening Australia: flora: the gardener's bible*. ABC Books. p 1308 ; Heller, C. A., 1962, *Wild Edible and Poisonous Plants of Alaska*. Univ. of Alaska Extension Service. p 71 ; Hibbert, M., 2002, *The Aussie Plant Finder* 2002, *Florilegium*. p 286 ; Johansson, A., Laakso, P. and Kallio, H., 1997, *Characterization of seed oils of wild, edible Finnish berries*. *Food Chemistry* 204:300-307 ; Joyce, D., 1998, *The Garden Plant Selector*. Ryland, Peters and Small. p 159 ; Kremer, B.P., 1995, *Shrubs in the Wild and in Gardens*. Barrons. p 172 ; MacKinnon, A., et al, 2009, *Edible & Medicinal Plants of Canada*. Lone Pine. p 125 ; Moerman, D. F., 2010, *Native American Ethnobotany*. Timber Press. p 511 ; *Plants For A Future database*, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. <https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/> ; Redzic, S. J., 2006, *Wild Edible Plants and their Traditional Use in the Human Nutrition in Bosnia-Herzegovina*. *Ecology of Food and Nutrition*, 45:189-232 ; Ryan, S., 2008, *Dicksonia. Rare Plants Manual*. Hyland House. p 50 ; Scotter, G. W., & Flygare, H., 1993, *Wildflowers of the Canadian Rockies*. Hurtig. p 30 ; Sfikas, G., 1984, *Trees and shrubs of Greece*. Efstathiadis Group. Athens. p 186 ; Sp. pl. 1:270. 1753 ; Turner, N., 1995, *Food Plants of Coastal First Peoples*. Royal BC Museum Handbook p 67 ; Turner, N., 1997, *Food Plants of Interior First Peoples*. Royal BC Museum Handbook p 103 ; van Wyk, B., 2005, *Food Plants of the World. An illustrated guide*. Timber press. p 336