

Atuna racemosa Raf.

Identifiants : 3885/aturac

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 05/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Malpighiales ;
- Famille : Chrysobalanaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Rosales ;
- Famille : Chrysobalanaceae ;
- Genre : Atuna ;

- Synonymes : *Cyclandrophora laurina* (A. Gray) Kostermans, *Parinarium laurinum* A. Gray, *Parinarium margarata* A. Gray, *Parinari glaberrima* Hassk, *Parinari hahlii* Warb, *Parinari laurina* A. Gray, *Parinari margarata* A. Gray ex J.W. Parham, et d'autres ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Ifiifi, Atuna tree, , Cheritem, Makita, Pohon rasemosa, Tabon-tabon ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit - aromatisant^{{{0(+x)}}}.

Les fruits sont utilisés pour parfumer l'huile de coco. Ils sont également utilisés pour aromatiser le poisson. Les jeunes fruits sont consommés partiellement crus avec du poisson cuit. Les graines sont consommées avec du poisson

Partie testée : fruit - saveur^{{{0(+x)}}} (traduction automatique)

Original : Fruit - flavour^{{{0(+x)}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro- vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
	0	0	0	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

Une plante tropicale. Aux Fidji, il passe du niveau de la mer à environ 500 m d'altitude. Il pousse dans les forêts et les prairies. Il est présent à Camarines, Albay, Masbate, Palawan et Mindanao aux Philippines. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il pousse dans les îles, Morobe et les provinces occidentales^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : A tropical plant. In Fiji it grows from sea level to about 500 m altitude. It grows in forest and grassland. It occurs in Camarines, Albay, Masbate, Palawan and Mindanao in the Philippines. In Papua New Guinea it grows in the islands, Morobe and Western Provinces^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

Samoa américaines, Asie, Brunei, Fidji, Indochine, Indonésie, Malaisie, Micronésie, Pacifique, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, PNG, Philippines, Pohnpei, Samoa, Asie du Sud-Est, Thaïlande, Tonga^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : American Samoa, Asia, Brunei, Fiji, Indochina, Indonesia, Malaysia, Micronesia, Pacific, Palau, Papua New Guinea, PNG, Philippines, Pohnpei, Samoa, SE Asia, Thailand, Tonga^{{{{0(+x)}}}}.

- **Notes :**

Il existe 8 espèces Atuna. Les fruits sont utilisés comme mastic pour sceller les pirogues^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : There are 8 Atuna species. The fruit are used as putty to seal canoes^{{{{0(+x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Burkill, I.H., 1966, A Dictionary of the Economic Products of the Malay Peninsula. Ministry of Agriculture and Cooperatives, Kuala Lumpur, Malaysia. Vol 1 (A-H) p 1659 (As Parinarium glaberrimum) ; Call, C. A., et al, 2004, Participatory Rural Appraisal in the Upland Ecosystem of Mt Malindang, Misamis Occidental, Philippines. Biodiversity Research Programme for Development in Mindanao. p 51 ; Clarke, W.C. & Thaman, R.R., 1993, Agroforestry in the Pacific Islands: Systems for sustainability. United Nations University Press. New York. ; Conn, B. & Damas, K.. Guide to trees of Papua New Guinea. <http://www.pngplants.org/PNGtrees> (As Atuna racemosa subsp. racemosa) ; Flora 27:583. 1844 (As Parinari glaberrima) ; Food Composition Tables for use in East Asia FAO <http://www.fao.org/infoods/directory> No. 954 (As Parinari glaberrima) ; GTZ 1996, A Guide to some Indigenous Fijian Trees. GTZ Suva. p 117 ; Liefing, A., et al, Samoan plant names. <http://en.wikipedia.org> ; Monsalud, M.R., Tongacan, A.L., Lopez, F.R., & Lagrimas, M.Q., 1966, Edible Wild Plants in Philippine Forests. Philippine Journal of Science. p 437 (As Parinari glaberrima) ; Prance, G. T., 2004, The Uses of Atuna racemosa Raf. (Chrysobalanaceae) in Samoa. Economic Botany. 58(3): 470-475 ; Reis, S. V. and Lipp, F. L., 1982, New Plant Sources for Drugs and Foods from the New York Botanical Garden herbarium. Harvard. p 106 ; Smith, A.C., 1985, Flora Vitiensis Nova, Lawaii, Kuai, Hawaii, Volume 3 p 51 ; Sukarya, D. G., (Ed.) 2013, 3,500 Plant Species of the Botanic Gardens of Indonesia. LIPI p 141 ; Sylva Tellur. 153. 1838 ; C. Wilkes, U.S. Expl. Exped., Phan. 15:490, t. 55. 1854 (As Parinari laurinum)