

Baccaurea racemosa (Reinw.) Muell. Arg. , 1866 (Engkumi)

Identifiants : 4007/bacrac

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 02/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Malpighiales ;
- Famille : Phyllanthaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Euphorbiales ;
- Famille : Euphorbiaceae ;
- Tribu : Antidesmeae ;
- Genre : Baccaurea ;

- Synonymes : *Coccomelia racemosa* Reinw. ex Blume, 1823 (=) basionym, *Baccaurea bhaswatii* Chakrab. & M.Gangop. 1994, *Baccaurea wallichii* Hook.f. 1887, *Coccomelia racemosa* Reinw. ex Blume 1823, *Coccomelia racemosa* Reinw. 1828 (basionyme caduque), *Pierardia racemosa* (Reinw. ex Blume) Blume 1826 ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : yellow menteng tree , kepundung (local), menteng (id), kapundung (ms) ;



- Note comestibilité : ***

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit (fruits^{27(+x),69} (chair : arillodes et péricarpes^{(((dp*))}) [nourriture/aliment : fruit⁽⁽⁽²⁽⁺⁾⁾)] comestible.

Détails :

Fruits consommés localement ; plante cultivée^{(((27(+x))}.

Les fruits sont consommés crus. Ils peuvent être sucrés ou acides. Attention: Il y a des rapports de vomissements en mangeant de grandes quantités de fruits.

Partie testée : fruit^{(((0(+x))} (traduction automatique)

Original : Fruit^{(((0(+x))}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro- vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
	0	0	0	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



De gauche à droite :

Par Bui Thuy ?ào Nguyên, via wikimedia

Par Sakurai Midori, via wikimedia

- **Petite histoire-géo :**

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Statut :**

C'est un arbre fruitier cultivé^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)}.

Original : It is a cultivated fruit tree^{{{{0(+x)}}}}.

- **Distribution :**

Une plante tropicale. Il pousse dans la forêt tropicale et dans les marécages d'eau douce. Il pousse jusqu'à 1 100 m d'altitude. À Cairns BG^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)}.

Original : A tropical plant. It grows in rainforest and in fresh water swamps. It grows up to 1,100 m above sea level. In Cairns BG^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

Asie, Australie, Brunei, Inde, Indochine, Indonésie, Malaisie, Asie du Sud-Est, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)}.

Original : Asia, Australia, Brunei, India, Indochina, Indonesia, Malaysia, SE Asia, Singapore, Sri Lanka, Thailand^{{{{0(+x)}}}}.

- **Notes :**

Il existe environ 80 espèces de Baccaurea^{{{{0(+x)}}} (traduction automatique)}.

Original : There are about 80 Baccaurea species^{{{{0(+x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

- ⁵"Plants For a Future" (en anglais) : https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Baccaurea_racemosa ;

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-18675 ;
- "GRIN" (en anglais) : ²<https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=6225> ;
- [Xycol69](#) ;

dont livres et bases de données : ²⁷ Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 44, par Louis Bubenicek) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Arora, R. K., 2014, *Diversity in Underutilized Plant Species - An Asia-Pacific Perspective*. Bioversity International. p 60 ; Bircher, A. G. & Bircher, W. H., 2000, *Encyclopedia of Fruit Trees and Edible Flowering Plants in Egypt and the Subtropics*. AUC Press. p 51 (Also as *Baccaurea wallichii*) ; Burkill, I.H., 1966, *A Dictionary of the Economic Products of the Malay Peninsula*. Ministry of Agriculture and Cooperatives, Kuala Lumpur, Malaysia. Vol 1 (A-H) p 280, Also p 283 (As *Baccaurea wallichii*) ; A. L. P. P. de Candolle, *Prodr.* 15(2):461. 1866 ; Giesen, W., 2013, *Paludiculture: sustainable alternatives on degraded peat land in Indonesia (revised draft)* ; Hanum, F. I., 1999, *Plant Diversity and Conservation Value of Ayer Hitam Forest, Selangor, Peninsula Malaysia*. Pertanika J. Trop. Agric. Sci. 22(2):73-83 ; Lembaga Biologi Nasional, 1977, *Buah-Buahan*, Balai Pustaka, Jakarta. p 90 ; Milow, P., et al, 2013, *Malaysian species of plants with edible fruits or seeds and their evaluation*. International Journal of Fruit Science. 14:1, 1-27 ; Priyadi, H., et al, 2010, *Five hundred plant species in Gunung Halimun Salak National Park, West Java. A checklist including Sundanese names, distribution and use*. CIFOR, FFPRI, SLU p 13 ; PROSEA (Plant Resources of South East Asia) handbook, Volume 2, 1991, *Edible fruits and nut*. p 98 ; PROSEA handbook Volume 9 *Plants yielding non-seed carbohydrates*. p 187 ; Saw, L.G., LaFrankie, J. V. Kochummen, K. M., Yap S. K., 1991, *Fruit Trees in a Malaysian Rain Forest*. Economic Botany, Vol. 45, No. 1, pp. 120-136 ; Slik, F., www.asianplant.net ; Sukarya, D. G., (Ed.) 2013, *3,500 Plant Species of the Botanic Gardens of Indonesia*. LIPI p 146 ; Tankard, G., 1990, *Tropical fruit. An Australian Guide to Growing and using exotic fruit*. Viking p 126 ; USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information Network - (GRIN). [Online Database] National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. Available: www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/econ.pl (10 April 2000) ; www.nationalherbarium.nl/thaueuph/ Flora of Thailand.