

Beckmannia eruciformis (L.) Host, 1805 (Herbe des marécages)

Identifiants : 4285/beceru

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 28/04/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Monocotylédones ;
- Clade : Commelinidées ;
- Ordre : Poales ;
- Famille : Poaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Liliopsida ;
- Ordre : Cyperales ;
- Famille : Poaceae ;
- Tribu : Aveneae ;
- Genre : Beckmannia ;

- Synonymes : x (=) basionym, Beckmannia erucaeformis (L.) Host 1805 ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : European slough, slough grass (sloughgrass) , scagliola acquatica (it), ryskt radgräs (sv) ;



- Note comestibilité : **

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit (graines^{5(+),27(+x)} cuites⁵⁽⁺⁾ [nourriture/aliment : céréale secondaire^{{{(dp*)}}}]) comestible.

Détails :

Graines consommées par les Indiens de l'Utah^{{{(27(+x))}}} ; les graines peuvent être broyées en farine et utilisées comme céréale ; elles ont une saveur douce et sont très petites mais faciles à récolter ; cependant elles doivent être séparées de leur enveloppe, ce qui est une opération très délicate. Certaines tribus Nord amérindiennes brûlaient les coques de ces graminées^{{{(5(+))}}}. Plante également consommée au Japon^{{{(27(+x))}}}.

Les graines sont mangées

Partie testée : graine^{{{(0(+x))}}} (traduction automatique)

Original : Seed^{{{(0(+x))}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
	0	0	0	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



Par Daderot (Travail personnel, domaine public), via wikimedia

- **Petite histoire-géo :**
- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

C'est une plante tempérée^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : It is a temperate plant^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

Asie, Canada, Europe, Japon, Amérique du Nord, USA^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : Asia, Canada, Europe, Japan, North America, USA^{{{{0(+x)}}}}.

- **Notes :**

Il n'y a que deux espèces de Beckmannia^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : There are only two Beckmannia species^{{{{0(+x)}}}}.

- **Liens, sources et/ou références :**

- **Tela Botanica** : <https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-50979> ;
- ⁵"Plants For a Future" (en anglais) : <https://www.pfaf.org/user/plant.aspx?latinname=Beckmannia+eruciformis> ;

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-399185 ;
- "GRIN" (en anglais) : <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=6619> ;

dont livres et bases de données : ²⁷Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 47 [Beckmannia erucaeformis (L.) Host], par Louis Bubenicek) ;

dont biographie/références : Brewer & Watson, Menninger, Sturtevant, Uphof, Usher :: Bubenicek, Hedrick, Tanaka, Yanovsky

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Beckstrom-Sternberg, Stephen M., and James A. Duke. "The Foodplant Database." <http://probe.nalusda.gov:8300/cgi-bin/browse/foodplantdb>. (ACEDB version 4.0 - data version July 1994) ; Bircher, A. G. & Bircher, W. H., 2000, Encyclopedia of Fruit Trees and Edible Flowering Plants in Egypt and the Subtropics. AUC Press. p 55 ; Hedrick, U.P., 1919, (Ed.), Sturtevant's edible plants of the world. p 91 ; Icon. descr. gram. austriac. 3:5, t. 6. 1805 ; Menninger, E.A., 1977, Edible Nuts of the World. Horticultural Books. Florida p 146 ; Plants for a Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK.

