

Beta vulgaris Linné, 1753 subsp. vulgaris var. vulgaris (Betterave)

Identifiants : 4574/betvulCBC

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 06/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Ordre : Caryophyllales ;
- Famille : Amaranthaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Caryophyllales ;
- Famille : Amaranthaceae ;
- Genre : Beta ;

- Synonymes : Beta vulgaris var. esculenta, Beta vulgaris var. vulgaris ;

- Synonymes français : betterave commune, betterave potagère, betterave rouge potagère, blète-rave (blète rave) ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : beetroot , Aitiace, Barba, Barbabietola, Bendjar, Beteraba, Betterave, Bit palang, Bittsu, Caiduong, Chaouender, Chukandar, Cu den, Divlja blitva, Hatrab, Hezab, Left m 'ta el-baqar, Palak, Palang sag, Palang, Palanki, Remolacha, Remolatsa, Rossa, Rote bete, Rote rube, Selk, Sellak, Semlakh, Serj, Sildj, Silk el Belebcha, Silk, Table beet, Tian cai ;



- Note comestibilité : ****

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Feuille (feuilles^{27(+x)} (cardes/côtes : limbe et pétiole^{{{(dp*)}}} {crues ou cuites}^{{{(27(+x))}}} [nourriture/aliment]) et racine (racines (crues ou cuites)^{{{(27(+x))}}} [nourriture/aliment : légume, salade^{{{(dp*)}}}]) comestible.

Détails :

Racines - chair crue/brute ; feuilles - brutes/crues^{{{(0(+x))}}} ; plante potagère importante ; nombreux cultivars^{{{(27(+x))}}}. Feuilles cuites (ex. : comme potherbe, brède, substitut d'épinard)^{{{(dp*)}}}.

Les tubercules rouges sont consommés après la cuisson. La racine est également séchée et pulvérisée et la farine mélangée à de l'orge ou du blé. Ils peuvent être marinés ou fermentés sous forme de jus de betterave. Ils sont souvent bouillis, tranchés et servis avec du vinaigre. Les dessus ou les feuilles sont comestibles. Ils sont cuits dans des soupes et des ragoûts. Les feuilles sont utilisées pour le sarma en Turquie. Ils sont enroulés autour d'une garniture de riz ou de viande hachée .

Partie testée : racine - chair crue^{{{(0(+x))}}} (traduction automatique)


Original : Root - raw flesh^{{{(0(+x))}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro- vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
87.1	118	28	1.3	4	6	0.8	0.4



néant, inconnus ou indéterminés. néant, inconnus ou indéterminés.

- **Note médicinale :** **
- **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**



Par Kerner, J.S., Abbildungen aller ökonomischen Pflanzen (1786-1798) Abbild. Oekon. Pfl., via plantillustrations

- **Nombre de graines au gramme :** 60/80 ;
 - **Liens, sources et/ou références :**
 - **Tela Botanica :** <https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-82084> ;
 - ⁵ **"Plants For a Future" (en anglais) :** https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Beta_vulgaris-vulgaris-vulgaris ;
- dont classification :**