

Buddleja salviifolia (L.) Lam.

Identifiants : 5408/budsal

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 02/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Astéridées ;
- Clade : Lamiidées ;
- Ordre : Lamiales ;
- Famille : Scrophulariaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Scrophulariales ;
- Famille : Scrophulariaceae ;
- Genre : Buddleja ;

- Synonymes : Buddleia salviifolia ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : South African sagewood, , Chipambati, Ewanci, Ilotana, Lelothwane, Mupambati, Olothana, Sagewood, Umbatae-wepe, Winter Buddleia ;



- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Feuilles - thé^{{{0(+x)}}}.

ATTENTION: Les baies peuvent être toxiques. Les fleurs et les feuilles fraîches ou séchées sont trempées dans de l'eau, sucrées avec du miel et bu à petites doses comme boisson santé

Partie testée : feuilles - thé^{{{0(+x)}}} (traduction automatique)

Original : Leaves - tea^{{{0(+x)}}}

Taux d'humidité	Énergie (kj)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Pro-vitamines A (µg)	Vitamines C (mg)	Fer (mg)	Zinc (mg)
	0	0	0	0	0	0	0



néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

C'est une plante tempérée chaude à subtropicale. Ils poussent à la lisière ou dans la forêt à feuilles persistantes. Ils se produisent également sur les pentes rocheuses des montagnes et le long des cours d'eau. Il a besoin d'un sol léger à moyen bien drainé. Il a besoin d'une position ensoleillée ouverte. Il résiste à la sécheresse et au gel. Au Zimbabwe, il pousse entre 1 200 et 2 500 m au-dessus du niveau de la mer. Il convient aux zones de rusticité 9-10. Jardins botaniques de Geelong^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).

Original : It is a warm temperate to subtropical plant. They grow at the edges of or in evergreen forest. They also occur on rocky mountain slopes and along watercourses. It needs a light to medium well-drained soil. It needs an open sunny position. It is resistant to drought and frost. In Zimbabwe it grows between 1,200-2,500 m above sea level. It suits hardiness zones 9-10. Geelong Botanical Gardens^{{{{0(+x)}}}}.

- **Localisation :**

*Afrique, Angola, Australie, Botswana, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Eswatini, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud *, Afrique australe, Swaziland, Tanzanie, Tasmanie, Zambie, Zimbabwe^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).*

Original : Africa, Angola, Australia, Botswana, Central Africa, East Africa, Eswatini, Malawi, Mozambique, South Africa, Southern Africa, Swaziland, Tanzania, Tasmania, Zambia, Zimbabwe^{{{{0(+x)}}}}.*

- **Notes :**

*Il existe environ 90 à 100 espèces de **Buddleja**. Ils sont dans les régions tropicales et subtropicales. Mettez également dans la famille **Buddlejaceae**^{{{{0(+x)}}}} (traduction automatique).*

*Original : There are about 90-100 **Buddleja** species. They are in the tropics and subtropics. Also put in the family **Buddlejaceae**^{{{{0(+x)}}}}.*

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

dont livres et bases de données : ⁰"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de ⁰"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Bodkin, F., 1991, Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 175 ; Fox, F. W. & Young, M. E. N., 1982, Food from the Veld. Delta Books. p 257 ; Encycl. 1:513. 1785 ; Etherington, K., & Imwold, D., (Eds), 2001, Botanica's Trees & Shrubs. The illustrated A-Z of over 8500 trees and shrubs. Random House, Australia. p 147 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 62 ; Fowler, D. G., 2007, Zambian Plants: Their Vernacular Names and Uses. Kew. p 78 ; Joffe, P., 2007, Creative Gardening with Indigenous Plants. A South African Guide. Briza. p 214 ; Long, C., 2005, Swaziland's Flora - siSwati names and Uses <http://www.sntc.org.sz/flora/> ; Lord, E.E., & Willis, J.H., 1999, Shrubs and Trees for Australian gardens. Lothian. p 208 ; Palgrave, K.C., 1996, Trees of Southern Africa. Struik Publishers. p 778 ; Plowes, N. J. & Taylor, F. W., 1997, The Processing of Indigenous Fruits and other Wildfoods of Southern Africa. in Smartt, L. & Haq. (Eds) Domestication, Production and Utilization of New Crops. ICUC p 187 ; Ryan, S., 2008, Dicksonia. Rare Plants Manual. Hyland House. p 11 ; Schmidt, E., Lotter, M., & McClelland, W., 2007, Trees and shrubs of Mpumalanga and Kruger National Park. Jacana Media p 544 ; Shava, S., 2000, The Use of Indigenous Plants as Food by a Rural Community in the Eastern Cape: an Educational Exploration. Masters Thesis Rhodes University. p 63 ; Swaziland's Flora Database <http://www.sntc.org.sz/flora/> ; Tredgold, M.H., 1986, Food Plants of Zimbabwe. Mambo Press. p 91 ; van Wyk, B, van Wyk, P, and van Wyk B., 2000, Photographic guide to Trees of Southern Africa. Briza. p 74 ; Venter, F & J., 2009, Making the most of Indigenous Trees. Briza. p 82 ; von Breitenbach, F., 1985, Southern Cape Tree Guide. Department of Environment Affairs, Forestry Branch. Pamphlet 360 Pretoria p 27 ; White, F., Dowsett-Lemaire, F. and Chapman, J. D., 2001, Evergreen Forest Flora of Malawi. Kew. p 338 ; Wilson, S., 1997, Some Plants are Poisonous. Reed. p 36 ; www.zimbabweflora.co.zw 2011