Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim., 1859 (Vigne d'argent)

Identifiants : 638/actpol

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 30/04/2024

- ***Classification phylogénétique :***
  - ***Clade : Angiospermes ;***
  - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
  - ***Clade : Astéridées ;***
  - ***Ordre : Ericales ;***
  - ***Famille : Actinidiaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
  - ***Règne : Plantae ;***
  - ***Division : Magnoliophyta ;***
  - ***Classe : Magnoliopsida ;***
  - ***Ordre : Theales ;***
  - ***Famille : Actinidiaceae ;***
  - ***Genre : Actinidia ;***
- ***Synonymes : Trochostigma polygama Siebold & Zucc. 1843 (=) basionym, Trochostigma polygama Siebold & Zucc, Actinidia volubilis (Siebold. & Zucc.) Planch ;***
- ***Synonymes français : kiwi pointu ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Silver vine, Matatabi , Gaedarae, Gezaomihoutao ;***

- ***Note comestibilité : *******
- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Fruit[5(+)] ([crus/cuits][5(12?)] ; dont graines[5(K)]) et feuille (Crues[5(+)] ou cuites[5(+)], dont roties [thé][5(12?)]) comestibles.

  Détails :

  Feuilles également cuites comme potherbe ? (qp*).

  Les fruits sont consommés crus ou cuits. Ils sont également salés. Les jeunes feuilles sont consommées cuites.Le fruit peut être amer. La sève est utilisée comme assaisonnement

  Partie testée : fruit[{{{0(+x) (traduction automatique)]
  Original : Fruit[{{{0(+x)]

Taux d'humidité	*Énergie (kj)*	*Énergie (kcal)*	*Protéines (g)*	*Pro-vitamines A (µg)*	*Vitamines C (mg)*	*Fer (mg)*	*Zinc (mg)*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

De gauche à droite :

Par Aomorikuma, via wikimedia
Par Qwert1234, via wikimedia

- ***Autres infos :***

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - ***Statut :***

    Les fruits sont considérés comme un mets délicat au Japon[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : The fruit are considered a delicacy in Japan[{{{0(+x)].

  - ***Distribution :***

    C'est une plante tempérée. Il pousse naturellement dans les bois et les haies des montagnes du Japon. Ils sont rustiques jusqu'à -30 ° C en dormance. Ils sont endommagés par le gel lorsqu'ils sont jeunes. Il convient aux zones de rusticité 4-9. Au Sichuan et au Yunnan[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : It is a temperate plant. It grows naturally in woodlands and hedges in mountains throughout Japan. They are hardy to -30Â°C when dormant. They are damaged by frost when young. It suits hardiness zones 4-9. In Sichuan and Yunnan[{{{0(+x)].

  - ***Localisation :***

    Asie, Australie, Chine, Japon, Corée, Mandchourie, Russie[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : Asia, Australia, China, Japan, Korea, Manchuria, Russia[{{{0(+x)].

  - ***Notes :***

    Il existe entre 40 et 60 espèces d'Actinidia. Les Actinidiacées sont une famille principalement tropicale[{{{0(+x) (traduction automatique)].

    Original : There are 40-60 Actinidia species. The Actinidiaceae are a mainly tropical family[{{{0(+x)].

- ***Liens, sources et/ou références :***

  - ***Wikipedia :***
    - https://fr.wikipedia.org/wiki/Actinidia_polygama (en français) ***;***
    - https://en.wikipedia.org/wiki/Actinidia_polygama (source en anglais) ***;***

  - [5]***"Plants For a Future" (en anglais) :*** 5https://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Actinidia+polygama ***;***

    dont classification :

  - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2620762 ***;***
  - ***"GRIN" (en anglais) :*** https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=1411 ***;***

dont livres et bases de données : [12]"Cornucopia II : A Source Book of Edible Plants" (livre en anglais, par Stephen Facciola) ;

dont biographie/références de [0]"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Arora, R. K., 2014, Diversity in Underutilized Plant Species - An Asia-Pacific Perspective. Bioversity International. p 34, 55 ; Biocyclopedia Edible Plant Species. biocyclopedia.org ; Bircher, A. G. & Bircher, W. H., 2000, Encyclopedia of Fruit Trees and Edible Flowering Plants in Egypt and the Subtropics. AUC Press. p 9 ; Brickell, C. (Ed.), 1999, The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants. Convent Garden Books. p 76 ; Chen, B. & Qiu, Z., Consumer's Attitudes towards Edible Wild Plants, Ishikawa Prefecture, Japan. p 22 www.hindawi.com/journals/ijfr/aip/872413.pdf ; Cundall, P., (ed.), 2004, Gardening Australia: flora: the gardener's bible. ABC Books. p 96 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications. p 2 ; Flowerdew, B., 2000, Complete Fruit Book. Kyle Cathie Ltd., London. p 134 ; Hedrick, U.P., 1919, (Ed.), Sturtevant's edible plants of the world. p 25 ; Hu, Shiu-ying, 2005, Food Plants of China. The Chinese University Press. p 552 ; Hwang, HS, et al, 2014, Distribution characteristics of plant in the Ungseokbong Mountain, Gyeongsangnam-do, Korea. Journal of Asia-Pacific Biodiversity. 7(2014) e164-e178 ; Kang, Y., et al, 2012, Wild food plants and wild edible fungi in two valleys on the Qinling Mountains (Shaanxi, central China) Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine; 9:26 ; Lamberton, K (Ed.), 2004, The Australian gardening encyclodepia. Murdoch Books, NSW Australia. p 144 ; Lyle, S., 2006, Discovering fruit and nuts. Land Links. p 47 ; Mem. Acad. Imp. Sci. St.-Petersbourg Divers Savans 9:64. 1859 (Prim. fl. amur.) ; Morton, J. F., 1987, Fruits of Warm Climates. Wipf & Stock Publishers p 299 ; Ong, H. G., et al, 2015, Ethnobotany of the wild edible plants gathered in Ulleung Island, South Korea. Genet Resourc crop Evol. Springer ; Plants for a Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/