

# Celtis lindheimeri Engelm., 1873 (Palo blanco)

Identifiants : 7199/cellin

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 04/05/2024

- Classification phylogénétique :

- Clade : Angiospermes ;
- Clade : Dicotylédones vraies ;
- Clade : Rosidées ;
- Clade : Fabidées ;
- Ordre : Rosales ;
- Famille : Cannabaceae ;

- Classification/taxinomie traditionnelle :

- Règne : Plantae ;
- Division : Magnoliophyta ;
- Classe : Magnoliopsida ;
- Ordre : Urticales ;
- Famille : Cannabaceae ;
- Genre : Celtis ;

- Synonymes : Celtis helleri Small 1897, dont homonymes : Celtis lindheimeri Engelm. ex K.Koch 1873 ;

- Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : Lindheimer's Hackberry , Palo blanco ;



- Note comestibilité : \*\*

- Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :

Fruit<sup>0(+x)</sup> (baies<sup>(dp\*)</sup>) comestible<sup>0(+x)</sup>.

Partie testée : fruit<sup>{{0(+x)}}</sup> (traduction automatique)

Original : Fruit<sup>{{0(+x)}}</sup>

| Taux d'humidité | Énergie (kj) | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Pro-vitamines A (µg) | Vitamines C (mg) | Fer (mg) | Zinc (mg) |
|-----------------|--------------|----------------|---------------|----------------------|------------------|----------|-----------|
|                 | 0            | 0              | 0             | 0                    | 0                | 0        | 0         |



néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

- Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

- **Autres infos :**

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

- **Distribution :**

*Il pousse le long des ruisseaux dans les collines calcaires. Il pousse entre 300 et 600 m d'altitude au Mexique*<sup>{{0(+x)}}</sup>  
(traduction automatique).

*Original : It grows along streams in limestone hills. It grows between 300-600 m altitude in Mexico*<sup>{{0(+x)}}</sup>.

- **Localisation :**

*Amérique centrale, Mexique, Amérique du Nord, USA*<sup>{{0(+x)}}</sup> (traduction automatique).

*Original : Central America, Mexico, North America, USA*<sup>{{0(+x)}}</sup>.

- **Notes :**

*Il existe 70 à 100 espèces de Celtis. Ils sont principalement sous les tropiques. Il existe 8 à 10 espèces en Amérique tropicale. Également mis dans la famille des Ulmacées*<sup>{{0(+x)}}</sup> (traduction automatique).

*Original : There are 70-100 Celtis species. They are mostly in the tropics. There are 8-10 species in tropical America. Also put in the family Ulmaceae*<sup>{{0(+x)}}</sup>.

- **Liens, sources et/ou références :**

dont classification :

- "The Plant List" (en anglais) : [www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2708344](http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2708344) ;

dont livres et bases de données : <sup>0</sup>"Food Plants International" (en anglais) ;

dont biographie/références de <sup>0</sup>"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

*Little, E.L., 1980, National Audubon Society Field Guide to North American Trees. Alfred A. Knopf. p 413 ; Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. <https://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/>*