

***Cheilocostus speciosus* (J.König) C.Specht, 2006 variegatus (Gingembre crêpe panaché)**

Identifiants : 7571/chespe1

Association du Potager de mes/nos Rêves (<https://lepotager-demesreves.fr>)

Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 08/05/2024

• **Classification phylogénétique :**

- **Clade :** Angiospermes ;
- **Clade :** Monocotylédones ;
- **Clade :** Commelinidées ;
- **Ordre :** Zingiberales ;
- **Famille :** Costaceae ;

• **Classification/taxinomie traditionnelle :**

- **Règne :** Plantae ;
- **Division :** Magnoliophyta ;
- **Classe :** Liliopsida ;
- **Ordre :** Zingiberales ;
- **Famille :** Costaceae ;
- **Genre :** *Cheilocostus* ;

• **Synonymes :** *Amomum arboreum* Lour, *Amomum hirsutum* Lamk, *Banksia speciosa* Koenig, *Costus loureiri* Horan, *Costus formosanus* Nakai, *Costus nepalensis* Roscea, *Costus sericeus* Blume, *Costus speciosus* (Koenig) Sm, et d'autres ;

• **Synonymes français :** canne d'eau panachée ;

• **Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) :** Crepe Ginger , uangz, Bai-qiekepa, Besemati, Besika dumpa, Betlauri, Bi qiao jiang, Buritokon, Cane-reed spiralflag, Cat loi, Chengalvakoshtu, Dot dang, Halduli, I-upo, Kemuka, Ken, Kenkemuka, Keon, Keu, Keukand, Keula, Kevkanda, Kewkanda, Koekand, Kuiravam, Larkaiya, Malay ginger, Maqbaomagaoqyyuq, Mia do, Ngueng maai na, Nuoyingdao, Ote kitamuli ba, Pacing, Penva, Pewda, Pha-lan-taung-hwa, Pushakara moola, Pushkarmula, Ru-rta, Setawar, Setengteng, Spiral Ginger, Tabar-tabar, Tar thok, Tawar, Tebu, Tiulasi, Trathok, Tubong-usa, Uang-din, Uang-maina, Uang-phetma, Uang-yai, Ueang-phet-maa, Unnithandu, Zhang liu tou ;



• **Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :**

Feuille (pousses tendres^{{{{12(+x)}}} cuites^(dp*) {bouillies ou cuites à la vapeur^{{{{12(+x)}}} } [nourriture/aliment ^{{{{(dp*)}}} : légume^{12(+x)} {ex. : comme potherbe^{{{{(dp*)}}}}] fruit (fruits^{12(+x)}) et racine (racines^{12(+x),27(+x)} [assaisonnement^(dp*) : condiment^{27(+x)}]) comestibles.

Détails :

Utilisation locale^{{{{27(+x)}}}. Les pousses tendres sont bouillies ou cuites à la vapeur et consommées comme légume^{{{{12}}} (ex. : comme potherbe^{{{{(dp*)}}}). Fruits et rhizomes sont parfois consommés^{{{{12}}}.

Les racines tubéreuses sont cuites et mangées. Ce n'est normalement que lorsque la nourriture est rare. Les jeunes pousses sont consommées dans des plats à soupe. Les jeunes feuilles peuvent être stockées pendant 7 à 8 jours.

ATTENTION: Les racines contiennent de la diosgénine, un précurseur de stéroïdes et d'hormones pour les contraceptifs



néant, inconnus ou indéterminés. néant, inconnus ou indéterminés.

• **Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):**

- ***Liens, sources et/ou références :***

dont classification :