Corymbia porrecta (S.T.Blake) K.D.Hill & L.A.S.Johnson, 1995

Identifiants : 9560/corpor

Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze

Dernière modification le 10/05/2024

- ***Classification phylogénétique :***
    - ***Clade : Angiospermes ;***
    - ***Clade : Dicotylédones vraies ;***
    - ***Clade : Rosidées ;***
    - ***Clade : Malvidées ;***
    - ***Ordre : Myrtales ;***
    - ***Famille : Myrtaceae ;***
- ***Classification/taxinomie traditionnelle :***
    - ***Règne : Plantae ;***
    - ***Division : Magnoliophyta ;***
    - ***Classe : Magnoliopsida ;***
    - ***Ordre : Myrtales ;***
    - ***Famille : Myrtaceae ;***
    - ***Genre : Corymbia ;***
- ***Synonymes : Eucalyptus porrecta S.T.Blake 1953 (synonyme, selon TPL) ;***
- ***Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : grey bloodwood ;***

- ***Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s) correspondant(s)) :***

  Feuille (feuilles et/ou tiges/rameaux : manne$^{\{\{\{(dp*)}$ {galle$^{0(+)(dp*)}$} [nourriture/aliment$^{\{\{\{(dp*)}$]) comestible$^{0(+x)}$.

  Détails :

  L'intérieur de galles trouvées sur l'arbre sont consommées$^{\{\{\{0(+x)}$; cette sorte de manne serait en faite une substance provoquée par un insecte : une galle induite, et/ou un miellat produit (sécrété), par une cochenille du genre Apiomorpha ; nous supposons que celle-ci exsude des feuilles et/ou des tiges/rameaux, comme chez bon nombre d'espèces d'Eucalyptus$^{\{\{\{(dp*)}$. Cette manne est-elle bien produite au niveau des feuilles et tiges ? (qp*)

  L'intérieur des galles trouvées sur l'arbre est mangé

  ATTENTION : le citronellal ou rhodinal, une huile essentielle présente dans la plupart des espèces d'eucalyptus, est très dangereux à plus ou moins haute(s) dose(s) ; voir lien pfaf ("5") d'une autre espèce d'Eucalyptus, pour plus d'informations.ATTENTION : le citronellal ou rhodinal, une huile essentielle présente dans la plupart des espèces d'eucalyptus$^{\{\{\{5(+)}$, est très dangereux à plus ou moins haute(s) dose(s) ; voir lien pfaf ("5") d'une autre espèce d'Eucalyptus, pour plus d'informations$^{\{\{\{(dp*)}$.

- ***Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):***

- ***Autres infos :***

  dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

  - ***Distribution :***

    C'est une plante tropicale{{{0(+x) (traduction automatique)}.

    Original : It is a tropical plant{{{0(+x)}.

  - ***Localisation :***

    Australie*{{{0(+x) (traduction automatique)}.

    Original : Australia*{{{0(+x)}.

  - ***Notes :***

    Il existe au moins 500 espèces d'eucalyptus principalement originaires d'Australie{{{0(+x) (traduction automatique)}.

    Original : There are at least 500 Eucalyptus species mostly originally in Australia{{{0(+x)}.

- ***Liens, sources et/ou références :***

  dont classification :

  - ***"The Plant List" (en anglais) :*** www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-48085 ***;***

    dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ;

    dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

    Bodkin, F., 1991, Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 444 ; Brock,J., 1993, Native Plants of Northern Australia, Reed. p 177 ; Cherikoff V. & Isaacs, J., The Bush Food Handbook. How to gather, grow, process and cook Australian Wild Foods. Ti Tree Press, Australia p 200 ; Elliot, W.R., & Jones, D.L., 1992, Encyclopedia of Australian Plants suitable for cultivation. Vol 4. Lothian. p 184 ; Hearne, D.A., & Rance, S.J., 1975, Trees for Darwin and Northern Australia. AGPS, Canberra p 63, Pl 15 ; Hibbert, M., 2002, The Aussie Plant Finder 2002, Florilegium. p 98 ; Lazarides, M. & Hince, B., 1993, Handbook of Economic Plants of Australia, CSIRO. p 106